
Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido, Trauma Craneal Abusivo y Maltrato Infantil



1

Tome Nota



Para grabar esta
sesión




Certificados &
Evaluación



2

Evaluación/Certificados

- 100 % de participación
- Evaluación
- Certificado



3

Objetivos de aprendizaje

Al final de este entrenamiento, los participantes podrán:

- 1) Definir el trauma craneal abusivo y el síndrome del bebé sacudido
- 2) Discutir tres signos y síntomas del trauma craneal abusivo
- 3) Describir la fase normal de desarrollo en la que los bebés lloran
- 4) Analizar dos estrategias que los proveedores de cuidado familiar pueden utilizar para manejar el estrés y prevenir el trauma craneal abusivo cuando los bebés lloran continuamente



4

¿Cuál es la conexión?

Síndrome del Bebé Sacudido

Trauma Craneal Abusivo

Maltrato Infantil



5

¡A platicar!




¿Cuáles son algunos desafíos que experimentas con un bebé nuevo en tu guardería familiar?



6

¡Todos los bebés lloran!



- Los bebés pueden llorar un promedio de dos a tres horas al día durante las primeras seis semanas de vida
- Los recién nacidos hasta el primer año (especialmente los bebés de 2 a 4 meses) están en mayor riesgo de sufrir lesiones por sacudidas



7

Período de llanto PÚPURA

- Patrón de pico
- Impredecible
- Resistente a la calma
- Expresión de dolor en el rostro
- Largos episodios de llanto
- Llanto en la tarde/noche



8

¡A platicar!



¿Qué estrategias utilizas para calmar a un bebé o niño?



9

¿Qué puedes hacer como proveedorc(a) de un FCC?



Crear un plan:

1. Intenta encontrar la razón por la que el bebé está llorando
2. Consuela al bebé
3. Camina con el bebé
4. Tómate un tiempo para ti
5. Habla con alguien



10

"Del llanto a la calma"



Estrategias para calmar al bebé:

- Frotando su espalda
- Meciéndolo suavemente
- Ofreciendo un chupete
- Cantando o hablando
- Dando un paseo
- Otras opciones



11

"Del llanto a la calma", continuación

- Verifica si hay signos de enfermedad o incomodidad (sarpullido en el pañal, dentición o ropa ajustada)
- Llama a la familia si sospechas que el bebé está herido o enfermo
- Evalúa si tiene hambre o necesita eructar
- ¡Cálmate a ti mismo/a!



12

Datos sobre el Síndrome del Bebé Sacudido (SBS):

Los bebés menores de 1 año de edad son los que corren el mayor riesgo de sufrir el Síndrome del Bebé Sacudido (SBS)

Se han informado lesiones por SBS en niños de hasta 5 años

SBS es el resultado de una sacudida violenta que conduce a una lesión cerebral

El desencadenante más común para sacudir a un bebé es el llanto inconsolable o excesivo

Los padres y sus parejas representan la mayoría de los perpetradores

En la mayoría de los casos de SBS, hay evidencia de alguna forma de abuso físico previo, que incluye sacudidas previas



13

Síndrome del bebé sacudido: ¿Qué sucede en el cerebro?

¡Nunca está bien sacudir a un bebé!

Loma Linda University

(<https://youtu.be/ddVwDXht7AU>)

<https://www.youtube.com/watch?v=ddVwDXht7AU>)



14

¡Peligros de sacudir a un bebé!

Los bebés que sufren menos daño por SBS pueden presentar algunos de los siguientes:

- Cambio en el patrón de sueño o incapacidad para despertarse
- Vómitos
- Convulsiones o ataques
- Irritabilidad
- Llanto incontrolable
- Incapacidad para ser consolado
- Incapacidad para amamantar o comer



15

¡Peligros de sacudir a un bebé!, continuación

En casos más severos de SBS, los bebés pueden:

- Convertirse en falta de respuesta
- Perder el conocimiento
- Desarrollar problemas respiratorios (respiración irregular o no respirar)
- No tener pulso



16

Consecuencias de SBS

- Muerte
- Ceguera
- Retraso mental o retrasos en el desarrollo y problemas de aprendizaje
- Parálisis cerebral
- Disfunción motora severa (debilidad muscular o parálisis)
- Espasticidad
- Convulsiones



17

¿Qué pueden hacer los(as) proveedores(as) de FCC?



Escribe en el chat una nueva estrategia que puedes usar en su FCC cuando los bebés o los niños lloran



18

¿Cuál es tu próximo paso?



Escribe el plan de acción del chat que puedes compartir con las familias sobre la prevención del síndrome del bebé sacudido



19

Recursos

- CDC: Preventing Abusive Head Trauma <https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/abusive-head-trauma.html>
- Preventing Child Abuse & Neglect (Fact Sheet) https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/can/CAN-factsheet_2022.pdf
- All Babies Cry <https://vimeo.com/266146917> or allbabiescry.com
- The Period of PURPLE Crying <http://www.purplecrying.info>
- American Academy of Pediatrics www.aap.org
- National Center on Shaken Baby Syndrome www.dontshake.org
- Prevent Child Abuse America www.preventchildabuse.org
- SBS and Child Maltreatment, visit: www.cdc.gov/injury




20



21

Cómo comunicarse con nosotros



(860) 288 - 7558



ctnurses@gmail.com



www.ctnurses.org/FCC



22


¡Gracias!



**HAGA CLIC EN EL ENLACE
PARA COMPLETAR LA
EVALUACIÓN**



**DESCARGUE SU
CERTIFICADO**



**¡CONÉCTESE CON CT
NURSES CONSULTANTS!**

